



ASSOCIAZIONE CHIMICA FARMACEUTICA  
LOMBARDA FRA TITOLARI DI FARMACIA



## DISTURBO BIPOLARE

### Cos'è?

Il disturbo bipolare è caratterizzato dall'alternanza di sintomi depressivi e sintomi di eccitazione (detti maniacali).

Il disturbo bipolare puro è relativamente poco comune nei bambini a causa della rarità con cui si manifesta con la tipica alternanza di periodi (fasi) con prevalenza di sintomi maniacali e periodi con sintomi depressivi. Più spesso i bambini con questo disturbo passano rapidamente da una fase all'altra oppure presentano "stati misti" in cui mostrano contemporaneamente sintomi depressivi e maniacali. Nel disturbo bipolare l'eccitazione e il rallentamento possono interessare non solo l'umore, ma anche i pensieri e l'attività motoria.

### Quali sono i sintomi/segni?

*Il bambino presenta potenziali sintomi maniacali quando manifesta:*

- un umore instabile, da insolitamente felice a molto irritabile, è arrabbiato, agitato o aggressivo;
- un aumento dell'autostima o grandiosità, si sente onnipotente o un supereroe con poteri speciali;
- un grande aumento di energia e un ridotto bisogno di sonno;
- parla eccessivamente e velocemente, passando troppo in fretta da un argomento all'altro;
- si distrae e l'attenzione si sposta continuamente da una cosa all'altra;
- ha ripetuti comportamenti rischiosi e scarsa percezione del pericolo.

*Il bambino presenta potenziali sintomi depressivi quando manifesta:*

- irritabilità, persistente tristezza o pianto frequente;
- frequenti lamentele fisiche come mal di testa o mal di stomaco;
- perde il piacere per le attività preferite;
- ha un basso livello di energia, stanchezza, scarsa concentrazione, noia;
- ha significativi cambiamenti delle abitudini alimentari o disturbi del sonno;
- ha pensieri di morte o di suicidio.

Alcuni di questi segni sono simili a quelli che si presentano in adolescenti con altri problemi come l'abuso di sostanze, il disturbo da deficit di attenzione e iperattività o in alcune forme di psicosi. Il disturbo bipolare può iniziare durante l'infanzia o l'adolescenza, anche se di solito è diagnosticato in età adulta. La malattia può colpire chiunque. Tuttavia se uno o entrambi i genitori hanno un disturbo bipolare le probabilità che i loro figli possano sviluppare il disturbo sono maggiori. Anche una storia familiare di abuso di sostanze o di alcool è associata a maggior rischio di disturbo bipolare.

La diagnosi di disturbo bipolare nei bambini e negli adolescenti è complessa e comporta un'attenta osservazione per un periodo di tempo prolungato. Una valutazione approfondita da parte di un neuropsichiatra infantile è utile per identificare il disturbo bipolare e iniziare la terapia.

### Come si cura?

La terapia del disturbo bipolare comprende l'educazione del paziente e della famiglia circa la malattia e la prescrizione di farmaci che stabilizzano l'umore che possono ridurre il numero e la gravità degli episodi maniacali, e aiutano a prevenire la depressione. La psicoterapia può essere utile in quanto aiuta il bambino a capire sé stesso, a ricostruire l'autostima e a migliorare i rapporti interpersonali.

La tua farmacia